

Spéleo-Club de Paris

C.A.F. 7, rue La Boétie, Paris (8^e)

La grotte de Torotoro (Bolivie)

En septembre 1966, J. CHABERT et J. MEUNIER ont exploré la *grotte de Umajalanta*, près du village de Torotoro dans les Andes boliviennes, à 130 km au sud de Cochabamba. Ils étaient accompagnés par Henry SAAVEDRA C., paléontologue du Service Géologique de Bolivie. Cet organisme, grâce à l'amabilité de son directeur M. Pereyra BASCOPÉ et du Professeur Léonard BRANISA, chef du Laboratoire de paléontologie, avait mis un véhicule à la disposition de l'expédition pour atteindre cette contrée reculée.

Située à 2.850 m d'altitude, d'un développement total de 1.620 m pour une profondeur de 140 m, la grotte est creusée dans le calcaire du crétacé supérieur. Il faut surtout y signaler la présence de nombreux poissons blancs dépigmentés, de 12 à 13 cm de long, aux yeux très régressés, de type silure. Quelques exemplaires sont actuellement à l'étude au Laboratoire Souterrain de Moulis, ainsi que des insectes et des grenouilles trouvés à 130 m sous terre.

Cette région de Torotoro semble être la seule zone karstique connue de Bolivie. Elle est peu étendue, mais de nombreuses cavités y restent à découvrir. D'autres grottes « immenses » sont souvent mentionnées par les informateurs (à Sorata et la Cueva Encantada près de Tarija notamment), mais elles n'appartiennent pas au type karstique.